

核准日期：2020年08月12日  
 修改日期：2021年01月29日  
 修改日期：2022年04月08日

# 氟维司群注射液说明书


请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称：氟维司群注射液  
 英文名称：Fulvestrant Injection  
 汉语拼音：Fuweisiquan Zhushuye

## 【成份】

本品活性成份为氟维司群，化学名称为：7α-[9-(4,4,5,5,5-五氟戊基亚硫酸基)壬基]雌甾-1,3,5(10)-三烯-3,17β-二醇。  
 辅料为：乙醇96%，苯甲醇，苯甲酸苄酯，蓖麻油。  
 化学结构式：



## 【性状】

本品为无色至黄色的澄明黏稠液体。

## 【适应症】

本品可用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的，或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后（包括自然绝经和人工绝经）雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌。  
 本品与阿贝西利联合用于治疗适用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌，用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。

## 【规格】

5mL: 0.25g。

## 【用法用量】

**成年女性（包括老年妇女）-氟维司群单药治疗：**推荐剂量为每月给药一次，一次500mg，首次给药后两周时需再给予500mg剂量。

**成年女性（包括老年妇女）-氟维司群与阿贝西利联合治疗：**氟维司群与阿贝西利联合使用时，氟维司群的推荐剂量为500mg，在第1、15、29天臀部缓慢肌注两支5mL注射液，每侧臀部注射一支，此后每月一次。

氟维司群与阿贝西利联合使用时，阿贝西利的推荐剂量为150mg口服，每日2次。阿贝西利可在空腹或进食情况下给药。请参见完整的阿贝西利说明书。

氟维司群联合阿贝西利治疗的绝经前/围绝经期女性应根据现有临床实践标准同时接受促性腺激素释放激素（LHRH）激动剂治疗。

## 【不良反应】

有关毒性事件中的剂量调整指南，合并用药以及其他相关安全性信息，请参见完整的阿贝西利说明书。

**儿童及青少年：**因尚未确定氟维司群在儿童及青少年中的安全性和有效性，故不推荐在该年龄层中使用氟维司群。

**肾功能损害的患者：**对于轻度至中度肾功能损害的患者（肌酐清除率≥30mL/min），无需调整剂量。未在严重肾功能损害的患者（肌酐清除率<30mL/min）中评价氟维司群的安全性和有效性，因此建议这些患者慎用（见【注意事项】）。

**肝功能障碍的患者：**对于轻度至中度肝功能障碍的患者无需调整剂量。但由于在这些患者中氟维司群的暴露可能增加，故应慎用氟维司群。没有氟维司群对于重度肝功能障碍患者的研究资料（见【禁忌】、【注意事项】和【药代动力学】）。

**使用方法：**臀部连续缓慢肌注两支5mL注射液（1-2分钟/5mL），每侧臀部注射一支。由于接近下面的坐骨神经，在臀部肌肉内外象限注射氟维司群时应谨慎。

**用药指南**  
 由于接近下面的坐骨神经，在臀部肌肉内外象限注射氟维司群时应谨慎（见【注意事项】）。  
 注意：使用前不得对安全型针头（BD SafetyGlide Shielding Hypodermic Needle）进行高压灭菌。在使用和处置过程中应始终保持将手置于注射针之后。

**每一支注射器的使用步骤：**

- 1、由托盘中取出玻璃注射针筒，检查是否有破损。
- 2、撕开安全型注射器（SafetyGlide™）外包装。
- 3、用溶液使用前进行目测，确保无微粒物质或变色。
- 4、直立握住注射器有棱纹的部分（C），另一只手握住盖子（A），并小心地逆时针旋转，直至盖子断开（见图1）。
- 5、沿笔直方向取下盖子（A），为了保持无菌，不要接触注射器尖端（B）（见图2）。
- 6、将安全针头连接到Luer-Lok接口并拧紧（见图3）。
- 7、在垂直平面移动之前，检查安全针头是否已固定到Luer接口。
- 8、将保护罩由注射针处拔出，不得损伤针尖。
- 9、将注射器置于注射部位，取下针头套。
- 10、排出注射器中多余气体。
- 11、在臀部缓慢肌内注射（1-2分钟/支），为方便使用者，针头斜面向上的位置指向推杆臂（见图4）。
- 12、注射后，立即用单指抬起辅助推杆臂，启动保护装置（见图5）。注：启动保护装置时远离自己和他人，启动时会听到“咔嚓”声音，检查确认针尖完全被覆盖。




图1




图2




图3




图4



图5

## 【用法用量】

根据临床研究，预填充型注射器仅供一次性使用。任何未使用的产品或废弃物应根据当地医疗卫生管理要求处理。

## 【禁忌】

因缺乏配伍禁忌研究，氟维司群不得与其它药物混合。

## 【不良反应】

### 单药治疗

根据临床研究、上市后研究或自发性报告提供的全部不良反应信息汇总的以下不良反应，最常见不良反应是注射部位反应、无力、恶心和肝酶（ALT、AST、ALP）升高。

以下不良反应的发生频率，是基于下述比较氟维司群500mg剂量及250mg剂量研究中氟维司群500mg治疗组的合并安全性分析计算而得的[CONFIRM（D6997C00002研究）、FINDER1（D6997C00004研究）、FINDER2（D6997C00006研究）以及NEWEST（D6997C00003研究）]，或仅源自比较了氟维司群500mg和阿那曲唑1mg的FALCON（D6997C00001研究）。如果合并安全性分析和FALCON之间的频率不同，则会显示最高的频率。下表所列的频率基于所有报告的不良反，无论研究者评估认为是否与治疗存在因果关系。

氟维司群500mg在临床研究中不良反应的总结

频率	系统器官	不良反应
十分常见（≥10%）	全身及注射部位	虚弱 <sup>a</sup> ，注射部位反应 <sup>a</sup>
	肝胆系统	肝酶升高(ALT, AST, ALP) <sup>a</sup>
	胃肠道	恶心
	免疫系统	过敏反应 <sup>a</sup>
	肌肉骨骼和结缔组织	关节和肌肉骨骼疼痛 <sup>a</sup>
常见（≥1%<10%）	皮肤及皮下组织	皮疹 <sup>a</sup>
	血管	潮热 <sup>a</sup>
	神经系统	头痛
	肝胆系统	胆红素升高 <sup>a</sup>
	胃肠道	静脉血栓栓塞 <sup>a</sup>
偶见（≥0.1%<1%）	肌肉骨骼和结缔组织	呕吐
	生殖系统和乳腺	腹泻
	血液及淋巴系统	厌食 <sup>a</sup>
	全身及注射部位	泌尿道感染
	免疫系统	背痛 <sup>a</sup>
偶见（≥0.1%<1%）	肝胆系统	阴道出血 <sup>a</sup>
	生殖系统和乳腺	血小板计数减少 <sup>a</sup>
	全身及注射部位	坐骨神经痛 <sup>a</sup> ，外周神经病变 <sup>a</sup>
	免疫系统	肝衰竭 <sup>a</sup> 、肝炎 <sup>a</sup> 、γ-GT升高 <sup>a</sup>
	全身及注射部位	颌颌念珠菌病 <sup>a</sup> 、白带 <sup>a</sup>
偶见（≥0.1%<1%）	全身及注射部位	注射部位出血 <sup>a</sup> 、注射部位血肿 <sup>a</sup> 、神经痛 <sup>a</sup>
	免疫系统	速发过敏反应

- a 包括因存在基础疾病无法准确评估与氟维司群相关性的药物不良反应。  
 b 注射部位反应术语不包括注射部位出血、注射部位血肿、坐骨神经痛、神经痛及外周神经病变。  
 c 该事件未在主要研究(CONFIRM、FINDER 1、FINDER 2、NEWEST)中观测到。频率计算采用点估计值的95%置信区间的上限。计算结果为3/560(其中，560是主要临床研究的患者数量)，与“偶见”频率相等。  
 d 包括：关节痛，较不常见的肌肉骨骼疼痛，肌痛和四肢疼痛。  
 e 合并安全性分析与FALCON频率类型不同。  
 f 在FALCON中未发现不良反应。

### 与阿贝西利联合治疗（MONARCH 2）

MONARCH 2评估了氟维司群（500mg）联合阿贝西利（150mg，每日两次）对比氟维司群联合安慰剂治疗的安全性。下述数据反映了在MONARCH 2中664例接受至少1剂氟维司群联合阿贝西利或安慰剂治疗的HR阳性、HER2阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者中本品的暴露情况。

接受氟维司群联合阿贝西利治疗患者的中位治疗持续时间为12个月，接受氟维司群联合安慰剂治疗患者的中位治疗持续时间为8个月。

由于不良反应导致剂量减少的情况发生于43%接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者。导致≥5%的患者剂量减少的不良反为腹泻和中性粒细胞减少。由于任何级别的腹泻导致阿贝西利剂量减少的情况发生于19%接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者和0.4%接受氟维司群联合安慰剂治疗的患者。接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者中有10%因任何级别的中性粒细胞减少症导致阿贝西利剂量减少，而接受本品联合安慰剂治疗的患者中未发生因中性粒细胞减少症进行的剂量调整。

氟维司群联合阿贝西利治疗组中9%的患者和氟维司群联合安慰剂治疗组中3%的患者因不良事件而永久终止研究治疗。导致接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者永久终止治疗的不良反应为感染（2%）、腹泻（1%）、肝酶毒性（1%）、疲乏（0.7%）、恶心（0.2%）、腹痛（0.2%）、急性肾损伤（0.2%）和脑梗死（0.2%）。

18例（4%）接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者在治疗期间或30天随访期间死亡（无论因果关系），而氟维司群联合安慰剂治疗组中为10例（5%）。接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者死亡原因包括：7例（2%）患者因基础疾病死亡，4例（0.9%）因脓毒症死亡，2例（0.5%）因肺部感染死亡，2例（0.5%）因肝酶毒性死亡，1例（0.2%）因脑梗死死亡。

氟维司群联合阿贝西利组报告的最常见不良反应（≥20%）为腹泻、疲乏、中性粒细胞减少症、恶心、感染、腹痛、贫血、白细胞减少症、食欲下降、呕吐和头痛（见下表）。最常见的（≥5%）3级或4级不良反应为中性粒细胞减少症、腹泻、白细胞减少症、贫血和感染。

### MONARCH 2中≥10%接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者和≥2%接受氟维司群联合安慰剂治疗的患者发生的不良反应

不良反应	氟维司群联合阿贝西利 N=441			氟维司群联合安慰剂 N=223		
	所有级别 <sup>a</sup>	3级 <sup>b</sup>	4级 <sup>b</sup>	所有级别 <sup>a</sup>	3级 <sup>b</sup>	4级 <sup>b</sup>
<b>胃肠系统疾病</b>						
腹泻	86	13	0	25	<1	0
恶心	45	3	0	23	1	0
腹痛 <sup>c</sup>	35	2	0	16	1	0
呕吐	26	<1	0	10	2	0
口腔黏膜炎	15	<1	0	10	0	0
<b>感染及侵袭性疾病</b>						
感染 <sup>d</sup>	43	5	<1	25	3	<1

不良反应	氟维司群联合阿贝西利 N=441			氟维司群联合安那剂 N=223		
	所有级别%	3级%	4级%	所有级别%	3级%	4级%
<b>血液及淋巴系统疾病</b>						
中性粒细胞减少症 <sup>3</sup>	46	24	3	4	1	<1
贫血 <sup>4</sup>	29	7	<1	4	1	0
白细胞减少症 <sup>5</sup>	28	9	<1	2	0	0
血小板减少症 <sup>6</sup>	16	2	1	3	0	<1
<b>全身性疾病及给药部位各种反应</b>						
疲乏 <sup>7</sup>	46	3	0	32	<1	0
外周水肿	12	0	0	7	0	0
发热	11	<1	<1	6	<1	0
<b>代谢疾病和营养不良</b>						
食欲下降	27	1	0	12	<1	0
<b>呼吸系统、胸及纵膈疾病</b>						
咳嗽	13	0	0	11	0	0
<b>皮肤及皮下组织类疾病</b>						
脱发	16	0	0	2	0	0
瘙痒症	13	0	0	6	0	0
皮疹	11	1	0	4	0	0
<b>各类神经系统疾病</b>						
头痛	20	1	0	15	<1	0
味觉障碍	18	0	0	3	0	0
头晕	12	1	0	6	0	0
<b>各类检查</b>						
丙氨酸氨基转移酶升高	13	4	<1	5	2	0
天冬氨酸氨基转移酶升高	12	2	0	7	3	0
肌酐升高	12	<1	0	<1	0	0
体重降低	10	<1	0	2	<1	0

1. 包括疲瘦、上腹痛、下腹痛、腹部不适和腹部触痛。
2. 包括上呼吸道感染、尿路感染、肺部感染、咽炎、结膜炎、鼻窦炎、阴道感染和瘀血症。
3. 包括中性粒细胞减少症和中性粒细胞计数降低。
4. 包括贫血、红细胞比容降低、血红蛋白减少和红细胞计数下降。
5. 包括白细胞减少症和白细胞计数降低。
6. 包括血小板计数降低和血小板减少症。
7. 包括乏力和疲乏。

MONARCH 2 中的其他不良反应包括静脉血栓事件（深静脉血栓形成、肺栓塞、脑静脉窦血栓形成、锁骨下静脉血栓形成、腋静脉血栓形成和下肢静脉血栓形成），发生于5%接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者和0.9%接受氟维司群联合安那剂治疗的患者。

#### MONARCH 2中≥10%接受氟维司群联合阿贝西利治疗的患者和≥2%接受氟维司群联合安那剂治疗的患者出现的实验室检查结果异常

实验室参数	氟维司群联合阿贝西利 N=441			氟维司群联合安那剂 N=223		
	所有级别%	3级%	4级%	所有级别%	3级%	4级%
肌酐升高	98	1	0	74	0	0
白细胞减少	90	23	<1	33	<1	0
中性粒细胞计数降低	87	29	4	30	4	<1
贫血	84	3	0	33	<1	0
淋巴细胞计数降低	63	12	<1	32	2	0
血小板计数降低	53	<1	1	15	0	0
丙氨酸氨基转移酶升高	41	4	<1	32	1	0
天冬氨酸氨基转移酶升高	37	4	0	25	4	<1

#### 【禁忌】

- 氟维司群禁用于：
  - 已知对氟维司群活性成份或任何辅料过敏的患者；
  - 孕妇及哺乳期妇女（见【孕妇及哺乳期妇女】）；
  - 严重肝功能损害的患者（见【注意事项】和【药代动力学】）。
- 氟维司群合用苯甲醇，禁止用于儿童肌肉注射。

#### 【注意事项】

轻度至中度肝功能损害的患者应慎用氟维司群（见【用法用量】、【禁忌】和【药代动力学】）。严重肝功能损害的患者应慎用氟维司群（肌酐清除率<30mL/min）。考虑到氟维司群的给药途径为肌注，有出血体质或血小板减少症或正接受抗凝剂治疗的患者应慎用氟维司群。

晚期乳腺癌妇女中常见血栓栓塞发生，这在临床研究中也观察到。当给予高危患者氟维司群治疗时应考虑到这一点。

曾报道过使用氟维司群注射液注射部位相关事件，包括坐骨神经痛、神经痛、神经病理性疼痛和外周神经病变。由于接近下面的坐骨神经，在臀部肌肉外上象限注射氟维司群时应谨慎（请见【用法用量】和【不良反应】）。

尚无氟维司群对不良反应的长期资料。考虑到氟维司群的作用机制，会有发生骨质疏松症的潜在危险。

干扰雌二醇抗体测定  
由于氟维司群和雌二醇的结构相似，氟维司群可能干扰基于抗体的雌二醇的抗体含量测定，并且可能导致雌二醇水平假性升高。

运动负荷慎用。

对于驾驶及操作机械能力的影响：  
氟维司群不会或很少会影响患者驾驶和操作机械的能力。然而氟维司群治疗期间常有虚弱力的报告。对于有这些不良反应的患者在驾驶和操作机械时应特别谨慎。

#### 【孕妇及哺乳期妇女用药】

育龄妇女  
育龄妇女在接受氟维司群治疗期间和最后一次给药后2年内应采取有效的避孕措施。  
妊娠  
孕妇禁用氟维司群（见【禁忌】）。在大鼠和家兔中单剂肌注氟维司群后，可见氟维司群透过胎盘。动物试验中显示氟维司群具有生殖毒性，包括胎儿畸形率和死亡率升高（见毒理研究）。如在服用氟维司群期间患者怀孕，应告知对胎儿的潜在危害和流产的可能。

哺乳  
在使用氟维司群期间，应停止哺乳。在哺乳大鼠中可见氟维司群分泌入乳汁。尚不明确氟维司群是否会分泌进入人的乳汁，考虑到氟维司群对哺乳期婴儿潜在的严重不良反应，哺乳期间禁用氟维司群（见【禁忌】）。

生育力  
尚未研究氟维司群对人类生育力的影响。

【儿童用药】  
因尚未确定氟维司群在儿童及青少年中的安全性和有效性，故不推荐在该年龄层中使用氟维司群。

【老年用药】  
在欧洲和北美进行的注册临床研究9238L/0020和9238L/0021中纳入了65岁以上患者，按年龄对肿瘤缓解进行评估时，氟维司群治疗组65岁及以上的患者出现客观缓解率分别为16%和11%。在中国进行的氟维司群250mg注册研究D6997L00004中纳入了35例65岁及以上患者，因病例数有限未进行比较分析。在中国进行的氟维司群500mg注册研究D6997L00021中纳入了27例65岁及以上患者，因病例数有限未进行比较分析。

【药物相互作用】  
与咪达唑仑（CYP3A4的底物）相互作用的临床研究表明氟维司群对CYP3A4无抑制作用。  
与利福平（CYP3A4的诱导剂）和酮康唑（CYP3A4的抑制剂）相互作用的临床研究表明，氟维司群的清除率未发生临床相关性的改变。故同时使用氟维司群与CYP3A4抑制剂或诱导剂时无需调整氟维司群给药剂量。

一项在乳腺癌患者中开展的临床研究中，氟维司群与阿贝西利未发生临床相关的药物相互作用。请参见完整的阿贝西利说明书。

【药物过量】  
有人用氟维司群过量的独立报告。如发生药物过量，应对症治疗。动物试验表明当使用高剂量的氟维司群时，未发生除直接或间接的抗雌激素效应以外的作用（见毒理研究）。

【药理毒理】  
药理作用  
多种乳腺癌表达雌激素受体（ER），雌激素可刺激这些肿瘤的生长。氟维司群为雌激素受体拮抗剂，亲和力和雌二醇相当，以竞争性的方式与雌激素受体结合，可下调乳腺癌细胞中的雌激素受体蛋白。氟维司群阻断了雌激素的营养作用而本身没有部分激动（雌激素样）活性。

体外研究表明，氟维司群是他莫昔芬类药物以及雌激素敏感的乳腺癌（MCF-7）细胞系生长的可逆性抑制剂。在体内肿瘤研究中，氟维司群可延缓裸鼠体内人乳腺癌MCF-7细胞异种移植瘤

的成瘤。氟维司群可抑制MCF-7异种移植瘤以及其他莫昔芬类药物腺癌异种移植瘤的生长。

在未成熟的或切除卵巢的小鼠和大鼠中进行的多次肌肉注射给药试验，氟维司群未表现出激动剂样作用。在未成熟的大鼠和切除卵巢的猴进行的体内研究中，氟维司群可阻断雌二醇引起的子宫增生作用。绝经后妇女给予氟维司群（每月250mg），未见血浆中FSH和LH浓度改变，提示无外周留体效应。

在一项患有原发性乳腺癌的绝经后妇女中进行的临床研究中，于手术前15-22天单剂剂量给予氟维司群，有证据表明雌二醇的增加ER的下调增加。这与剂量相关的孕激素受体（一种雌激素调节蛋白）表达减少有关。这些对ER通路的影响也与Ki67指数（一种细胞增殖标志物）的降低有关。

#### 毒理研究

在多次给药试验中，氟维司群及其它制剂的氟维司群在被测动物中均有良好的耐受性。局部反应（包括注射部位的肌炎和肉芽肿）由溶媒导致；但与生理盐水相比，家兔中肌炎发生的严重程度随氟维司群剂量的升高而增加。在大鼠和大鼠中进行的多次肌肉注射给药试验显示，大多数观察到的效应是由氟维司群抗雌激素活性导致，尤其是在雌性动物的生殖系统结构中，但也包括两种性别动物中对激素敏感的其他器官。长期（12个月）给药后，部分动物的不同组织出现动脉炎。

大鼠经口和静脉注射给药试验中，可见对心血管系统的作用（经口给药时，心电图ST段略有抬升；静脉注射时，一只大鼠出现窦性停搏）。上述情况发生在暴露量高于患者（C<sub>max</sub>>15倍）的水平，认为可能对临床剂量下人安全性意义有限。

#### 遗传毒性

在加入和不加入哺乳动物肝脏代谢活化因子的情况下，氟维司群在多项体外试验中未见致突变性或致畸性（包括应用鼠伤寒沙门氏菌及大肠杆菌菌株进行的细菌回复突变试验、在人淋巴细胞中进行的体外细胞遗传学研究、在小鼠淋巴细胞中进行的哺乳动物细胞突变试验和大鼠体内微核试验）。

#### 生殖毒性

雌性大鼠于交配前2周和交配后1周给予氟维司群，在剂量≥0.01mg/kg/天（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量的0.6%）时，可致生育力和胚胎存活率下降。剂量为0.001mg/kg/天（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量的0.06%）时，未见氟维司群对雌性大鼠生育力和胚胎存活的不利影响。在剂量为2mg/kg/天时（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量），29天停药后期雌性大鼠的生育力恢复至对照组水平。氟维司群对雌性大鼠生殖能力的影响与其抗雌激素活性一致。未研究氟维司群对雄性动物生育力的潜在影响，但在一项为期6个月的毒理学研究中，大鼠肌肉注射给予氟维司群15mg/kg/30天、10mg/只/30天或10mg/只/15天，可见生精小管精子丢失、生精小管萎缩和附睾的逆行性改变。停药后20周，睾丸和附睾的病变并未恢复。上述氟维司群剂量相当于女性患者推荐剂量500mg/月时系统暴露量[AUC<sub>0-24h</sub>]的1.3倍、1.2倍和3.5倍。

着床前至着床，大鼠每日给予氟维司群（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体每日最大推荐剂量的0.6%）可致胚胎丢失。妊娠大鼠于器官发生期前注射给予氟维司群≥0.1mg/kg/天（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量的6%），对胚胎-胎仔发育的影响与其抗雌激素活性一致。氟维司群可致加大鼠胎仔畸形的发生率升高（2mg/kg/天剂量下可见后爪关节弯曲；以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量），剂量≥0.1mg/kg/天时可致第一颈椎的齿状突和腹侧结节未骨化。氟维司群2mg/kg/天可致胎仔丢失。妊娠免于器官发生期给予氟维司群，肌注剂量为1mg/kg/天（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量）时可致流产。0.25mg/kg/天（以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量的30%）剂量下，可致胎盘重量和着床后丢失增加。器官发生期给予氟维司群导致胚胎发育异常发生率增加（骨盆带后移位和27个骶前椎骨；0.25mg/kg/天，以mg/m<sup>2</sup>计，相当于人体推荐剂量的30%）。

大鼠于哺乳期给予氟维司群2mg/kg剂量，乳汁中的氟维司群含量约为血浆中的12倍。哺乳期大鼠给予氟维司群，通过乳汁进入幼仔体内的药物暴露量估计为给药剂量的10%。在一项哺乳期大鼠研究中，两次给予10mg/kg或单次给予15mg/kg（以mg/m<sup>2</sup>计，低于人体推荐剂量），子代存活率略有降低。

#### 致癌性

在大鼠和小鼠进行了为期两年的致癌性研究。在两个种属中都观察到阳性结果。大鼠肌肉注射15mg/kg/30天、10mg/只/30天、10mg/只/15天，分别相当于女性患者推荐剂量500mg/月时系统暴露量[AUC<sub>0-24h</sub>]的0.9倍、1.5倍和3倍（雌性大鼠）和0.8倍、0.8倍和2倍（雄性大鼠）。雌性大鼠给予10mg/只/15天和雄性大鼠给予15mg/只/30天时，良性卵巢颗粒细胞肿瘤和睾丸莱迪希细胞肿瘤（Leydig cell tumor）的发生率升高。

小鼠经口给予氟维司群20、150和500mg/kg/天，分别相当于女性患者推荐剂量500mg/月时系统暴露量[AUC<sub>0-24h</sub>]的0.8倍、8.4倍和18倍（雌性小鼠）及0.8倍、7.1倍和11.9倍（雄性大鼠）。在150、500mg/kg/天剂量下，小鼠卵巢的良性间质瘤（良性肿瘤）的发生率增加。上述肿瘤的诱导产生与抗雌激素类药物导致的药理学相关的促性腺素水平内分泌反馈改变相一致。

#### 【药代动力学】

##### 吸收

肌肉注射氟维司群长效制剂后，氟维司群吸收缓慢，约5天后血浆浓度达峰（C<sub>max</sub>）。按照氟维司群500mg给药方案，第1个月内暴露量达到（接近）稳态（平均[C<sub>V</sub>]：分别为AUC 475 [33.4%] ng·天/mL、C<sub>max</sub> 25.1 [35.3%] ng/mL、C<sub>min</sub> 16.3 [25.9%] ng/mL）。稳态时，氟维司群血浆浓度维持在相对狭窄的范围内，峰浓度与谷浓度之间约相差3倍。肌肉注射给药后，在50至500mg剂量范围，暴露量与剂量近似成正比。

##### 分布

氟维司群分布快速而广泛。其稳态表观分布容积(V<sub>d,ss</sub>)非常大（约3-5L/kg），这表明主要分布在血管外。氟维司群与血浆蛋白高度结合（99%）。极低密度脂蛋白（VLDL），低密度脂蛋白（LDL）和高密度脂蛋白（HDL）部份为主要的结合对象，未进行竞争性蛋白结合的相互作用研究。尚未确定性激素结合球蛋白（SHBG）的作用。

##### 代谢

未对氟维司群的代谢进行充分研究，但包括了与许多与内源性甾体相似的可能的生物转化途径。在抗雌激素模型中，所鉴别出的代谢产物活性（包括17-酮，酮，3-硫化，3-和17-葡萄糖醛酸代谢产物）与氟维司群类似或较低。使用人的肝制品和重组人药酶进行的研究表明，CYP3A4是唯一参与氟维司群氧化的P450同工酶，然而在体内，非-P450途径更占主导地位。体外数据提示氟维司群不抑制CYP450同工酶。

##### 清除

氟维司群主要以代谢物形式清除，主要的排泄途径是通过粪便（约90%），仅有少于1%是通过尿液排泄。氟维司群的清除率很高，为11±1.7mL/min/kg，表明了较高的肝脏清除率。肌注后终末半衰期(t<sub>1/2</sub>)由吸收速率控制，估计为50天。

##### 特殊人群

对早期临床研究资料进行群体药代动力学分析，不同年龄（33-89岁）、体重（40-127公斤）或种族之间，未发现氟维司群的药代动力学参数有差异。

##### 肾功能损害

轻至中度的肾功能损害不会使氟维司群的药代动力学发生有任何临床相关性的变化。

##### 肝功能损害

在一项单次给药的临床研究中，选取轻至中度肝功能损害（Child-Pugh分级A或B级）的受试者评价氟维司群的药代动力学。使用了作用时间较短的肌肉注射剂，采用高剂量。与健康受试者相比，肝功能受损的受试者AUC升高2.5倍。在使用氟维司群的患者中，暴露量升高达到该数量级预期安全性良好。未对严重肝功能损害（Child-Pugh分级C级）的患者进行过评价。

##### 性别：

单次静脉注射给药后，男性与女性之间或绝经前妇女与绝经后妇女之间的药代动力学并无差异。同样，肌肉注射给药后，男性与女性之间妇女之间的药代动力学也无差异。

##### 人种：

在晚期乳腺癌给药试验中，对294名女性评价了因种族引起药代动力学差异的可能，试验中包括87.4%的白种人、7.8%的黑种人和4.4%的西班牙裔人。在各组中，氟维司群在血浆中的药代动力学并无差异。在一项单独的试验中，绝经后日本妇女的药代动力学数据与非日本患者的数据相似。

##### 【贮藏】

2-8℃保存。为了避光，应将预填充型注射剂贮于原包装中。

##### 【包装】

预灌装注射器组件及预灌装注射器用氯化丁基橡胶活塞，5mL/支，2支/盒。

##### 【有效期】

24个月。

##### 【执行标准】

国家药品监督管理局标准YBH02882020。

##### 【批准文号】

国药准字H20203412。

##### 【药品上市许可持有人】

名称：正大天晴药业集团股份有限公司  
注册地址：江苏省连云港市郁州南路369号

##### 【生产企业】

企业名称：正大天晴药业集团股份有限公司  
生产地址：江苏省连云港市郁州南路369号  
邮政编码：222026  
电话号码：0518-85804002，4007885028  
传真号码：0518-85806524  
网 址：http://www.ctq.com